

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

ABONNEMENT ANNUEL

(Tél. 92-97-11 - Postes 440 & 449)

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

Régie de Recettes de la D. D. A.

Sous-Régisseur de Recettes du Service de la Protection des Végétaux, Cité Administrative,
CLERMONT-FERRAND - 63

30,00 F

Supplément n° 1 au Bulletin n° 152 de MAI 1973.-

N O Y E R S

BACTERIOSE.-

Dans la plupart des cas, les variétés à débourrement précoce sont parvenues au stade sensible au niveau des bourgeons terminaux : bourgeons éclatés, écailles et bractées écartées, premières feuilles commençant à se dessécher.

Il est conseillé d'effectuer, dès réception de cet avis, un premier traitement sur toutes les variétés parvenues au stade ci-dessus indiqué.

Utiliser une bouillie cuprique à la dose de 150 g de cuivre métal et employer un minimum de 800 litres de bouillie à l'hectare pour ce traitement.

Sur les autres variétés, plus tardives, intervenir dès que le stade sensible sera atteint.

V I G N E

BLACK-ROT.- (départements de l'Allier et de la Corrèze)

Les germes susceptibles de provoquer les premières contaminations sont à maturité.

Dans les vignes atteintes l'an dernier (région de MONTLUÇON - Allier - en particulier), ainsi que dans celles situées à proximité de parcelles incultes dans lesquelles la maladie a déjà été observée, effectuer un traitement dans les meilleurs délais, les vignes étant, dans la grande majorité des cas, à un stade très sensible (stade D à E, du tableau reproduit au verso).

Dans les autres situations (majorité du vignoble), il est inutile d'intervenir.

Pour les produits à utiliser, consulter le bulletin n° 150 de MARS.

BRENNER.-

Dans les vignes où cette maladie est à craindre (les feuilles de la base des rameaux et les inflorescences se dessèchent et tombent), effectuer un traitement au stade 3 à 4 feuilles étalées (stade E).

Utiliser un produit cuprique, du captafol, du mancozèbe, du manèbe, du mancopper ou une association de cuivre et de zinèbe.

Clermont-Ferrand, le 10 Mai 1973.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chargé des Avertissements Agricoles
A. LECLERC.

Le Chef de la Circonscription
Phytosanitaire :
P. DENIZET.


Imprimerie de la Station "AUVERGNE & LIMOUSIN"
Directeur-Gérant : L. BOUYX.

Tirage n° 857 du 10 Mai 1973 - ABONNEMENT 1973 - Expédition n° 9.

Dernière note parue : Bulletin n° 152, le 3 Mai.


P 336

Stades repères de la vigne




A

Bourgeon d'hiver




B

Bourgeon dans le coïon



C

Pointe verte



D

Sortie des feuilles



E

Feuilles étalées



F

Grappes visibles



G

Grappes séparées



H

Boutons floraux séparés



I

Floraison



J

Nouaison